

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto	ROXICAINA POMADA
Registro Sanitario	INVIMA 2012M-012600-R2 / Fabricar y vender
Vía de administración	Tópica (externa)
Indicaciones	Anestésico local para uso tópico.
Presentación comercial	Caja con un tubo colapsible de aluminio x 10 g y 20 mg.
Composición	Cada 100 g de ungüento contienen Lidocaina Base 5 g
Vida útil	Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación
Observación	Venta con fórmula médica
Dosificación	De acuerdo a criterio médico
Contraindicaciones y advertencias	Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes
Precauciones	No aplicar directamente sobre heridas abiertas ni heridas infectadas. Lávese las manos después de manipular los sistemas
Reacciones adversas	Salpullido, ronchas, hinchazón o sensación anormal en el sitio de la aplicación
Interacciones	No se conoce ninguna interacción ni incompatibilidad a la fecha.
Condiciones de almacenamiento	Temperatura no mayor a 30 °C, en su envase y empaque original.
Uso después de abierto	Luego de abierto el producto se debe consumir durante un periodo de 30 días (dependiendo del número de aplicaciones, puede ser un tiempo inferior), a temperatura no mayor de 30 °C, conservado dentro del estuche y protegido de la luz.
Eliminación de desechos	Residuos del medicamentos en estado semisólido, se deben diluir con abundante agua, antes de disponerse al drenaje, previa obtención de autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas ambientales. <i>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2002</i>