

WESCOHEX SOLUCIÓN

Antiséptico para la piel

REGISTRO SANITARIO N°: 2009M0009291

CARACTERÍSTICAS

Solución tópica germicida a base de gluconato de clorhexidina al 2.3%, ideal en la preparación del campo pre y post operatorio, inyectología y en el tratamiento de heridas, laceraciones y raspaduras.

WESCOHEX SOLUCIÓN tiene acción rápida, persistente y de amplio espectro de microorganismos como bacterias Gram +, Gram -, así como de hongos. Es un producto de acción residual, el cual no es absorbido por la piel; lo mismo que su acción antiséptica y desinfectante no es inactivada en presencia de material orgánico.

WESCOHEX SOLUCIÓN no produce irritación ni sensibilidad en la piel.

VENTAJAS

- Amplio espectro
- La rápida actividad bactericida
- Propiedades residuales en la piel
- Activa en presencia de materia orgánica
- Baja alérgicas o tóxicas respuestas
- Ninguna o mínima absorción sistémica

MODO DE APLICACIÓN

Utilice la cantidad necesaria de acuerdo a la zona a cubrir de forma que la piel quede totalmente impregnada de la solución.

RECOMENDACIONES DE USO

En inyectología impregnar una torunda de algodón con el producto y aplicar en el sitio donde se realizará la punción en forma circular de adentro hacia afuera sin devolverse en un área de 5 cm aproximadamente.

En áreas quirúrgicas aplicar por aspersión en el sitio donde se realizó o se realizará la incisión ampliando la zona y dejándolo secar libremente.

En el tratamiento de heridas, laceraciones y raspaduras, desgermine previamente la piel y aplique la técnica recomendada para curaciones.

DOSIFICACIÓN

Utilice la cantidad necesaria de acuerdo a la zona a cubrir de forma que la piel quede totalmente impregnada de la solución.



WESCOHEX SOLUCIÓN

Antiséptico para la piel

REGISTRO SANITARIO N°: 2009M0009291

CONTENIDO DE INGREDIENTE ACTIVO Y COMPOSICIÓN

| | |
|--|-------|
| Cada 100 ml de producto contiene: | |
| Gluconato de Clorhexidina al 20% | |
| Equivalente a 2.3% de ingrediente activo | |
| Excipientes c.s.p. | 100ml |

ESPECIFICACIONES

| Parámetros | Valor Mínimo |
|-----------------------------|--|
| Densidad (mínimo) | 1.01 gr/cc |
| pH (mínimo) | 5.9 |
| % Gluconato de clorhexidina | 2.3 |
| Aspecto | Líquido translucido homogéneo, de color amarillo |

CAPACIDAD MICROBICIDA

| ORGANISMO | TIEMPO DE CONTACTO |
|------------------------------------|--------------------|
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> | 1 min. |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 1 min. |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> | 1 min. |
| <i>Corynebacterium diphtheriae</i> | 30 seg. |
| <i>Serratia marcescens</i> | 30 seg. |
| <i>Escherichia coli</i> | 30 seg. |
| <i>Salmonella typhosa</i> | 30 seg. |
| <i>Salmonella choleraesuis</i> | 30 seg. |
| <i>Proteus vulgaris</i> | 30 seg. |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 30 seg. |
| <i>Shigella sonnei</i> | 30 seg. |
| <i>Candida albicans</i> | 30 seg. |

WESCOHEX SOLUCIÓN

Antiséptico para la piel

REGISTRO SANITARIO N°: 2009M0009291

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Hipersensibilidad a los componentes. La clorhexidina utilizada como antiséptico por vía tópica no debe ser empleada en pacientes con enfermedades de la piel o heridas que afectan a capas no superficiales de la piel.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos, los oídos y la boca. Si esto ocurriera, enjuagar inmediatamente con agua abundante.

Conservar en un lugar fresco y protegido de la luz.

ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y bien ventilado, alejado de temperatura extrema y de los rayos directos del sol.

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra en la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIONES

30 ml

60 ml

120 ml

500 ml

1000 ml