
	<b>PERIO-AID 0.12% GEL</b>	<b>Agosto 2014</b>
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>Página 1 de 13</b>

## ÍNDICE

- 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (COMPOSICIÓN)**
- 2. INDICACIONES Y USOS DEL PRODUCTO**
- 3. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL PRODUCTO**
- 4. PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO**
- 5. CONTROLES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO**
- 6. MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO**
- 7. LISTA DE NORMAS EMPLEADAS EN LA PRODUCCIÓN Y CONTROLES DE CALIDAD.**
- 8. ARTES FINALES DEL PRODUCTO TERMINADO**

**1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (COMPOSICIÓN)**

<b>C-032-02-B</b>		
<b>DENOMINACIÓN INCI</b>	<b>% (P/P)</b>	<b>NÚM. CAS</b>
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE	0,12	18472-51-0
AQUA	68,496	7732-18-5
GLYCERIN	15,00	56-81-5
XYLITOL	10,00	87-99-0
HYDROXYETHYLCELLULOSE	2,75	9004-62-0
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL	1,60	61788-85-0
AROMA	1,00	-
POLYETHYLENE	1,00	9002-88-4
COCAMIDOPROPYL BETAINE (100%)	0,028	61789-40-0
SODIUM SACCHARIN	0,005	128-44-9
C.I. 42090 (100%)	0,00085	3844-45-9

	<b>PERIO-AID 0.12% GEL</b>	<b>Agosto 2014</b>
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>Página 3 de 13</b>

## **2. INDICACIONES Y USOS DEL PRODUCTO**

- Ayuda a prevenir las encías sensibles
- Después de procedimientos odontológicos
- Ayuda en la prevención de la formación de la placa dental

## **3. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL PRODUCTO**


- No utilizar en caso de hipersensibilidad a cualquier componente de Perio-Aid 0.12% gel dentífrico
- En algunos casos puede presentarse una alteración del gusto y sensación urente en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto.
- Tras uso prolongado y al contacto con ciertas bebidas y alimentos tales como vino tinto, café, té i tabaco, puede presentarse una coloración de dientes y lengua.

## **4. PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO**

Envases de 75 ml.

5. CONTROLES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

EPA008-01C2/ EMPA003 Ed.4	
PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN
<b>FÍSICO-QUÍMICOS</b>	
Aspecto y características organolépticas	Gel dental azul, opaco, homogéneo. Olor mentolado.
Control visual y soldadura	Correcto
Ph	6,75
Densidad (g/ml)	1,080
Valoración de digluconato de clorhexidina (%)	0,120
<b>MICROBIOLÓGICOS</b>	
Recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales (bacterias, levaduras y mohos) (UFC en 1 ml o g)	$\leq 5 \times 10^2$
Recuento de Hongos (mohos y levaduras) (UFC en 1ml o g)	$\leq 1 \times 10^2$
Recuento de Enterobacterias (UFC en 1 ml o g)	$\leq 1 \times 10^2$
<i>Escherichia coli</i> (en 1 ml o g)	Ausencia
Otras <i>Enterobacteriaceae</i> ( en 1ml o g)	Ausencia
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (en 1 ml o g)	Ausencia
Otras <i>Pseudomonadaceae</i> (en 1 ml o g)	Ausencia
<i>Staphylococcus aureus</i> (en 1 ml o g)	Ausencia
<i>Candida albicans</i> (en 1 ml o g)	Ausencia
<i>Salmonella sp</i> (en 1 ml o g)	Ausencia

 DENTAID Expertos en Salud Bucal	PERIO-AID 0.12% GEL	Agosto 2014
	FICHA TÉCNICA	Página 5 de 13

## 6. MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

El producto caducado o que no cumpla con las especificaciones de producto terminado será rechazado y considerado como residuo de producto terminado. Estos residuos de producto terminado son gestionados a través de un gestor autorizado. Los residuos son recogidos de forma controlada por el gestor autorizado y se les aplica un tratamiento de estabilización, para neutralizar cualquier componente peligroso para el medioambiente.

## 7. LISTA DE NORMAS EMPLEADAS EN LA PRODUCCIÓN Y CONTROLES DE CALIDAD.

Los producto cosméticos cumplen con los requisitos mencionados en *REGLAMENTO (CE) No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO* y están fabricados de acuerdo a las “Lignes directrices de bonnes pratiques de production des produits cosmetiques” (BPPC) publicadas por el Consejo de Europa en 1995.

## 8. ARTES FINALES DEL PRODUCTO TERMINADO

### Etiqueta

# PERIO-AID®

0,12%

**PERIO-AID®**  
0,12%

**INGREDIENTS:** Aqua, Glycerin, Xylitol, Hydroxyethylcellulose, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyethylene, Chlorhexidine Digluconate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Saccharin, Aroma, CI 42090

Non abrasif / No abrasivo / Non abrasif / nincs koptató hatása / НЕАБРАЗИВНАЯ / nie ścierająca / غير كاشط

**Anti-plaque gel toothpaste**  
0,12 % Chlorhexidine digluconate

**Gel dentífrico antiplaca**  
0,12% Digluconato de clorhexidina

**Gel dentifrice anti-plaque**  
0,12 % Digluconate de chlorhexidine

**Anti-plakk gél fogkrém**  
0,12% klórhexidin-diglukonát

**Анти-бактериальная зубная паста-гель**  
0,12% Хлоргексидина биглюконата

**Pasta do zębów w żelu przeciw płytce nazębnej**  
0,12% Dwuglikonian chlorheksydyny

**جل أسنان (مضاد للبلاك)**  
كلور هيكسيدين ثنائي جلوكونات 0.12%

**PERIO-AID®** E- Does not contain anionic agents. Keep out of reach of children. Do not swallow. Best before: see container

SP- No contiene agentes aniónicos. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Usar preferentemente antes de final de: ver envase.

F- Ne contient pas d'agent anionique. Garder hors de portée des enfants. Ne pas avaler. A utiliser avant le: voir l'emballage

HU- Nem tartalmaz anionos összetevőt. Gyermekektől tartsa távol! Ne nyelje le! Minőségét megőrzi: lásd a dobozon.

RU- Не содержит анионных агентов. Хранить в недоступном для детей месте. Не проглатывать. Рекомендуется сначала: посмотреть упаковку.

PL- Nie zawiera środków anionowych. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połkaj. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

لا يحتوي على عوامل أيونية. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. لا تبتلع. يفضل استخدامه قبل: اطلاع على العبوة الخارجية.

**DENTAID** Made in Spain by DENTAID S.L. Spain  
Distributed in the EU by: visit [www.dentaid.com](http://www.dentaid.com)

Imported and distributed by: Pharmapl Drug Store - U.A.E / Laboratoires PHARMA - Tanger, Maroc / Inter Promo Labo Ltd. - Cotonou, Bénin / Novodont - Opatija, Croatia / Al'ahd Pharma - Tripoli, Libya/ Meda Pharma - Cairo, Egypt / MEGAMED SAL - Beirut, Lebanon / Azur Pharma - Sfax, Tunisie / ООО «ДентАид Интернешнл» - Москва, Россия, / ООО «ФВЦІАР-ЦЕНТР» - г. Киев, Украина

PERIO: Laboratorios Dentaid Perú S.A.S. Calle Los Toleros N°155 Zona Industrial Wilkano, Ate, Lima - Perú, RUC: 20502334990, R.S. NSOC38496-1000

Colombia: BIOSKIOS S.A.S. Nit 900.245.646-4. [www.bioskios.com](http://www.bioskios.com), (057) 4 444 55 28. MEDELLIN- COLOMBIA, R.S. NSOC38496-1000

المستورد: شركة كومل - الرياض المملكة العربية السعودية  
HU- 2422/2011 OÉTI










102812

**75ml e**

Estuche

<p><b>PERIO-AID</b> 0,12%</p>	<p><b>PERIO-AID</b> 0,12%</p>	<p><b>Anti-plaque gel toothpaste</b> 0,12 % Chlorhexidine digluconate</p> <p><b>Gel dentífrico antiplaca</b> 0,12% Digluconato de clorhexidina</p> <p><b>Gel dentifrice anti-plaque</b> 0,12 % Digluconate de chlorhexidine</p> <p><b>DENTAID</b></p> <p>Anti-plaque gel toothpaste 0,12%</p>	<p><b>PERIO-AID</b> 0,12%</p> <p>Anti-plaque gel toothpaste</p>
<p><b>Gel dentífrico antiplaca</b> <b>PERIO-AID</b> 0,12%</p>	<p><b>PERIO-AID</b> 0,12%</p>	<p><b>Anti-plakk gél fogkrém</b> 0,12% klórhexidin-diglukonát</p> <p><b>Анти-бактериальная зубная паста-гель</b> 0,12% Хлоргексидина диглюконата</p> <p><b>Pasta do zębów w żelu przeciw płytce nazębnej</b> 0,12% Dwuglikonian chlorheksydyny</p> <p><b>جل أسنان (مضاد للبلاك)</b> كلور هيكسیدین ثنائي جلوكونات 0.12%</p> <p><b>DENTAID</b></p>	<p>10282010</p>
<p><b>E</b> - Does not contain anionic agents. Keep out of reach of children. Do not swallow. Best before: see container <b>SP</b> - No contiene agentes aniónicos. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Usar preferentemente antes de final de ver emase. <b>F</b> - Ne contient pas d'agent anionique. Garder hors de portée des enfants. Ne pas avaler. A utiliser avant le voir l'emballage. <b>HU</b> - Nem tartalmaz anionos összetevőt. Gyermektől társas távol! Ne nyelje le! Mindöglét megdizi: léd a dobozon. <b>RU</b> - Не содержит анионных агентов. Хранить в недоступном для детей месте. Не проглатывать. Рекомендуется сначала: посмотреть упаковку. <b>PL</b> - Nie zawiera środków anionowych. Przechowyw w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połkaj. Data ważności: la بطري على عوامل أيونية. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. لا تبتلع. يفضل استخدامه قبل: اطلاع على العبوة الخارجية.</p>	<p><b>HU</b> - Segíti megelőzni a fogíny érzékenységet • Foglászati beavatkozás előtt és után • Hatékonyan harcol a plakkok (Biofilm) ellen <b>RU</b> - Предотвращает чувствительность десен • До и после лечения зубов • Эффективно борется с зубным налетом <b>PL</b> - Zapobiega stanom zapalnym dziąseł • Do stosowania przed i po zabiegach dentystycznych • Skutecznie zwalcza płytkę nazębną (Biofilm)</p>	<p>• يساعد على منع حساسية اللثة • قبل وبعد العناية بالأسنان • يحارب بلاك الأسنان بكفاءة</p> <p><b>INGREDIENTS:</b> Aqua, Glycerin, Xylitol, Hydroxyethylcellulose, Peg-4D Hydrogenated Castor Oil, Polyethylene, Chlorhexidine Digluconate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Saccharin, Aroma, CI 42090 Non abrasive / No abrasives / Non abrasif / nincs kopotás hatása / HEAEPABHAP / nieścierający / غير كشط</p> <p>HU-2422/2011 0E11</p> <p>8 427426 022485</p> <p><b>DENTAID</b> Made in Spain by DENTAID SL Spain Distributed in the EU by: visit www.dentaid.com Imported and distributed by: Pharmad Drug Store P.O. Box 37345, U.A.E. / Laboratoires IPHARMA - Tanger, Maroc / Inter Promo Labco Ltd. - Colsony, Slovenia / Navodon - Djurdjevac, Croatia / Al-Batri Pharma - Tripoli, Libya / Meda Pharma - Cairo, Egypt / MEGAMED SAL - Beirut, Lebanon / Azur Pharma - Sfax, Tunisia / OOO «Дев-Фарма Интернекиа», - Москва, Россия / OOO «ФРК ТАР-ДЕНТИП» - г. Киев, Украина <b>Perid</b> Laboratorios Dentaid Puro S.A.S., Calle Los Yébenes N° 155 Zona Industrial Liliñana, Atlix, Yucatán - Perid, RUC: 20602334900, R.S. NSCC38496-1000. <b>Colombia:</b> BIOCINOS S.A.S, Nit 900.245.046-4, www.20602334900.com, (57) (4) 444 55 28. <b>MEDLIFE - COLOMBIA, R.S. NSCC38496-1000</b> المستورد: شركة كومل - الرياض المملكة العربية السعودية</p> <p><b>75ml e</b></p>	<p>10282010</p>

*Prospecto*

102811 		
<p><b>GEL TOOTHPASTE ANTI-PLAQUE</b></p> <p><b>COMPOSITION</b> Chlorhexidine digluconate 0,12 %</p> <p><b>USE IN THE FOLLOWING CASES</b> To help fight excessive formation of dental plaque (biofilm) during periodontal maintenance or treatment when gums are irritated or sensitive. To completely remove dental plaque, when used together with tooth brushing and interdental cleaning. When using a chlorhexidine mouthwash, Perio-Aid 0,12% Gel does not contain anionic agents which could affect chlorhexidine's activity.</p> <p><b>DOSAGE AND ADMINISTRATION GUIDELINES</b> Brush teeth carefully at least 2 times per day, paying special attention to affected areas. Perio-Aid 0,12% Gel can also be applied topically. <b>DO NOT SWALLOW. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN</b></p> <p><b>CONTRAINDICATIONS</b> Contraindicated in persons who have experienced allergic reaction to any of Perio-Aid's 0,12% Gel ingredients.</p> <p><b>SIDE EFFECTS</b> In some cases alteration of taste may be experienced, which generally lessens with continued use of the product. This product contains chlorhexidine, an active ingredient that may temporarily stain teeth and tongue. This staining usually only occurs after prolonged use of the product and when in contact with certain drinks and foods, such as red wine, coffee, tea and tobacco. This colouring effect is not permanent and can be avoided by brushing the teeth before rinsing. In any event, it can be removed by the dentist.</p>		
		
<p><b>GEL DENTÍFRICO ANTIPLACA</b></p> <p><b>COMPOSICIÓN</b> Digluconato de Clorhexidina 0,12%</p> <p><b>MODO DE EMPLEO</b> El gel dentífrico combate la formación excesiva de placa dental en el mantenimiento periodontal. Como complemento del cepillado dental e interdental, para eliminar la placa dental. El gel dentífrico PERIO-AID® no contiene agentes aniónicos que puedan interaccionar con un enjuague bucal con clorhexidina.</p> <p><b>NO UTILIZAR</b> En caso de hipersensibilidad a cualquier componente de Perio-Aid® 0,12% gel dentífrico.</p> <p><b>EFFECTOS SECUNDARIOS</b> En algunos casos puede presentarse una alteración del gusto y sensación urente en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto. Tras uso prolongado y al contacto con ciertas bebidas y alimentos tales como vino tinto, café, té y tabaco, puede presentarse una coloración de dientes y lengua. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental.</p>		





**PERIO-AID**

**0,12%**

F

## GEL DENTIFRICE ANTI-PLAQUE

### COMPOSITION

Digluconate de chlorhexidine 0,12 %

### UTILISER DANS LES CAS SUIVANTS

Le gel dentifrice aide à lutter contre la plaque dentaire (biofilm) dans le cadre d'une maintenance ou d'un traitement quand les gencives sont sensibles. Complète l'efficacité du brossage classique et du brossage inter-dentaire pour éliminer la plaque dentaire.

Le gel dentifrice Perio-Aid 0,12% ne contenant pas dans sa formule d'agent anionique il n'affecte pas l'action d'un bain de bouche à la chlorhexidine.

### MODE D'EMPLOI

Brossez-vous les dents soigneusement, au moins deux fois par jour, en portant une attention particulière aux zones cibles.

Ce gel peut également être utilisé en application locale.

**NE PAS AVALER. CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**

### NE PAS UTILISER

Contre-indiqué chez tous ceux qui ont eu une réaction allergique à l'un ou l'autre des ingrédients de Perio-Aid 0,12% Gel.

### AUTRES EFFETS

Une altération du goût et une irritation de la face dorsale de la langue sont peu fréquentes. Elles diminuent généralement au cours du traitement.

En cas d'utilisation prolongée et en combinaison avec certaines boissons (vin rouge, le café et le thé), certains produits alimentaires et le tabac, une légère coloration des dents et la langue est possible. Ces colorations disparaissent en général dès l'arrêt des rinçages et peuvent être évités pour une grande partie en se brossant les dents soigneusement avant le rinçage.

Votre chirurgien-dentiste pourra éliminer ces colorations au cours d'une simple visite.

**PERIO-AID****0,12%**

HU

**Anti-plakk gélfogkrém.****ÖSSZETÉTEL**

Klórhexidin-diglukonát 0,12%

**JAVALLATOK**

Segít leküzdeni a plakk (Biofilm) túlzott képződését parodontális kezelés, vagy fenntartó kezelés alatt, amikor az íny érzékeny, irritált. Fogmosással és fogközi tisztítással kiegészítve használata teljesen eltávolítja a foglepedéket. Mivel a Perio-Aid Gél nem tartalmaz anionos összetevőt, így klórhexidin tartalmú szájvíz egyidejű használatánál nem befolyásolja a klórhexidin hatékonyságát.

**ADAGOLÁSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Mosson fogat a készítménnyel legalább naponta kétszer, különös figyelmet fordítva az érintett területekre. A Perio-Aid Gél helyileg is alkalmazható, NE NYELJE LE! GYERMEKEKTŐL TARTSA TÁVOL!

**ELLENJAVALLATOK**

Ellenjavallt a Perio-Aid Gél bármely összetevőjével szemben korábban érzékenységet tapasztaló személyeknek.

**MELLÉKHATÁSOK**

Ritkán ízérzés zavara figyelhető meg, ami általában csökken a termék folyamatos használata során. A készítmény klórhexidin hatóanyaga ideiglenesen elszínezheti a fogakat és a nyelvet. Az elszíneződés általában csak hosszabb idejű használat esetén, valamint bizonyos ételek, italok (vörösbor, tea, kávé) fogyasztása mellett és dohányzás miatt fordulhat elő. Az elszíneződés nem maradandó. Mindenesetre fogorvosra könnyen eltávolítja.



RU

**Антибактериальная паста-гель****СОСТАВ**

Хлоргексидин биглюконат 0,12%

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ**

Использовать для того, чтобы помочь бороться с излишним образованием зубного налёта во время стадии поддержания здорового состояния пародонта или лечения, когда десна раздражены или чувствительны. Также используется для того, чтобы полностью удалить зубной налёт при одновременной чистке зубов и чистке межзубных промежутков. При использовании ополаскивателя с хлоргексидином зубная паста-гель Perio-Aid 0,12% не содержит отрицательно заряженных агентов, которые могли бы повлиять на действие хлоргексидина.

**ДОЗИРОВКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Чистите зубы после приема пищи, желательнее 2 раза в день в течение 14 дней, не менее 2-х минут, обращая особое внимание на затронутые области. Зубная паста-гель Perio-Aid® может быть также нанесена на десна, не смывая. НЕ ПРОГЛТЫВАТЬ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Не рекомендуется детям и лицам с аллергической реакцией на хлоргексидин.

**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Возможно в некоторых случаях изменение вкуса, темное окрашивание зубов, а также ощущение жжения на языке, что устраняется после отмены этого продукта. Это средство содержит хлоргексидин, активный ингредиент, которые может временно вызвать окрашивание зубов и языка. Это окрашивание обычно случается после длительного применения этого средства и также при взаимодействии с определенными напитками и едой такими, как красное вино, чай и табак. Эффект окрашивания не постоянен и может быть предотвращен путем чистки зубов до ополаскивания полости рта. При использовании продукции серии Perio-Aid® с хлоргексидином биглюконатом 0,12% необходимо получить консультацию стоматолога.

**DENTAID**

www.dentaid.com

**PERIO-AID**  
0,12%

PL

### Pasta do zębów w żelu przeciw płytce nazębnej

**Skład**

0,12% Dwuglikonian chlorheksydyny

**Użyć w następujących przypadkach**

Zapobiega nadmieremu gromadzeniu się płytki nazębnej (biofilmu) zarówno w leczeniu periodontologicznym jak i podtrzymującym, gdy dziąsła są podrażnione lub wrażliwe. Aby całkowicie usunąć płytkę nazębną stosować pastę razem ze szczoteczką do zębów i szczoteczkami do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych.

Perio-Aid 0,12% pasta do zębów w żelu może być stosowana równocześnie z płynami do płukania jamy ustnej zawierającymi chlorheksydynę ponieważ nie zawiera Śródków anionowych redukujących jej działanie.

**Sposób użycia i dawkowanie**

Szczotkuj zęby dokładnie, co najmniej 2 razy dziennie, zwracając szczególną uwagę na miejsca chorobowo zmienione.

Perio-Aid 0,12% pastę do zębów w żelu można również stosować miejscowo, NIE POŁYKAĆ. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Przeciwwskazania**

Uczulenie na którykolwiek ze składników pasty do zębów w żelu Perio-Aid 0,12%.

**Możliwe działania niepożądane**

W niektórych przypadkach może wystąpić zaburzenie odczucia smaku, które stopniowo będzie zanikać podczas stosowania pasty. Produkt zawiera chlorheksydynę, aktywny składnik który może powodować tymczasowe przebarwienia zębów oraz języka. Przebarwienia mogą pojawić się po dłuższym używaniu pasty oraz w połączeniu z niektórymi napojami lub potrawami, takimi jak czerwone wino, kawa, herbata czy tytoń. Nie są one trwałe i można ich uniknąć dokładnie szczotkując zęby lub przez profesjonalne czyszczenie w gabinecie.

**بيريو.ايد**

0,12%



## جل أسنان (مضاد للبلاك)

### التركيبة:

كلورهيكسيدين ثنائي كلوركوات 0.12%

### يستعمل في الحالات التالية:

يساعد في محاربة التشكل الزائد للبلاك (طبقة ثنائية) عندما تكون اللثة متهيجة أو حساسة خلال فترة صيانة أو علاج اللثة، لإزالة البلاك تماما، عند استعماله مع فرش ومنظفات ما بين الأسنان. عند استعمال غسول فم كلورهيكسيدين، فإن جل أسنان بيريو.ايد 0.12% لا يحتوي على عوامل أنيونية والتي قد تؤثر في نشاط الكلور هيكسيدين.

### الجرعة وطريقة الإستعمال:

فرش الأسنان بعناية على الأقل مرتين يوميا، احرص على المناطق المتأثرة.

جل أسنان بيريو.ايد 0.12% يمكن استخدامه موضعيا.

لا تبتلع، يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

### موانع الإستعمال:

يمنع استعماله من الأشخاص الذين يعانون من حساسية من استعمال أي من مركبات جل أسنان بيريو.ايد 0.12%.

### الأعراض الجانبية:

في بعض الحالات قد يحدث تغير بالطعم. وهو ما يقل عادة بالإستعمال المستمر للمنتج.

المنتج يحتوي على الكلور هيكسيدين، وهي مادة فعالة قد تؤدي وبشكل مؤقت لصبغ أو بقع في الأسنان واللسان. عادة تظهر هذه الصبغة أو البقع فقط عند استعمال المنتج لفترات طويلة وكذلك عند تزامن استعمالها مع أنواع من المشروبات والماكولات مثل القهوة، الشاي أو التبغ.

أثار هذه البقع غير دائمة ويمكن تفاديها بتفريش الأسنان قبل استعمال الغسول. في جميع الحالات يمكن إزالة هذه البقع عند طبيب الأسنان.

**E PRESENTATION**

**Perio-Aid 0,12% chlorhexidine**  
• Mouthwash 150 ml  
• Mouthwash 500 ml  
• Gel toothpaste 75 ml  
• Spray 50 ml

**Perio-Aid Maintenance (0,05 % chlorhexidine)**  
• Mouthwash 150 ml  
• Mouthwash 500 ml

**SP PRESENTACIONES**

**Perio-Aid 0,12%** (0,12% clorhexidina)  
• Colutorio 150 ml  
• Colutorio 500 ml  
• Gel dentífrico 75 ml  
• Spray 50 ml

**Perio-Aid Maintenance (0,05% clorhexidina)**  
• Colutorio 150 ml  
• Colutorio 500 ml

**F PRÉSENTATIONS**

**Perio-Aid 0,12%** (0,12% chlorhexidine)  
• Flacon de 150 ml  
• Flacon de 500 ml  
• Spray 50 ml  
• Gel dentifrice 75 ml

**Perio-Aid Maintenance (0,05% chlorhexidine)**  
• Flacon de 150 ml  
• Flacon de 500 ml

**HU KISZERELÉSEK**

**Perio-Aid 0,12%** (0,12% klórhexidin)  
• Szájvíz 150 ml  
• Szájvíz 500 ml  
• Gélfogkrém 75 ml  
• Spray 50 ml

**Perio-Aid Maintenance - Fenntartó**  
(0,05% klórhexidin)  
• Szájvíz 150 ml  
• Szájvíz 500 ml

**RU ФОРМА ВЫПУСКА**

**Perio-Aid 0,12%** (0,12% хлоргексидина)  
• Ополаскиватель 500 мл  
• Ополаскиватель 150 мл  
• Ополаскиватель 5 л  
• Гель-паста 75 мл  
• Спрей 50 мл

**Perio-Aid Maintenance (0,05% хлоргексидина)**  
• Ополаскиватель 500 мл  
• Ополаскиватель 150 мл

**PL Dostępne produkty**

**Perio-Aid 0,12%** (0,12% chlorheksydyna)  
• Płyn do płukania ust 150 ml  
• Płyn do płukania ust 500 ml  
• Żel do mycia zębów 75 ml  
• Spray 50 ml

**Perio-Aid Maintenance (0,05% chlorheksydyna)**  
• Płyn do płukania ust 150 ml  
• Płyn do płukania ust 500 ml

**العنوان:**

بيرو.ايد المحافظه (0.05% كلور هيكسيدين)  
• غسول للفم 150مل  
• غسول للفم 500مل

بيرو.ايد 0.12% كلور هيكسيدين  
• غسول للفم 150مل  
• غسول للفم 500مل  
• جل مضمون الأسنان 75مل  
• بخاخ 50مل